

## Impfungen ab 2024

Liebe Eltern

Grundsätzlich geben wir die Empfehlungen der *Eidgenössischen Impfkommision für Impffragen* (EKIF) weiter. Wir sind mit der Impfkommision der Meinung, dass die empfohlenen Impfungen nützlich und hilfreich sind. Wir finden es auch gut, dass es in der Schweiz keine Impfpflicht gibt und dass alle Eltern nach ausreichender Aufklärung darüber entscheiden sollen, welche Impfungen ihre Kinder erhalten sollen.

Wenn Eltern sich gegen bestimmte Impfungen für Ihre Kinder aussprechen, gehen wir davon aus, dass sie in jedem Fall gute Gründe dafür haben. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Sie zu informieren. Auch dann, wenn wir anderer Meinung sind oder im Einzelfall sogar vor den Konsequenzen warnen.

Während der ersten Lebensmonate beinhalten die Empfehlungen in der Schweiz die meist wenig diskutierte 6-fach-Impfung (DTPa-IPV-HiB-HB) und die Pneumokokkenimpfung. Diese werden für das Alter von 2 und 4 Monaten empfohlen (und nach dem ersten Geburtstag, dabei mindestens 6 Monate Abstand zur letzten Gabe). Im Alter von 9 und 12-15 Monaten ist die MMRV-Impfung empfohlen und ab dem 1. Geburtstag die einmalige Impfung gegen Meningokokken-ACWY.

Seit dem Januar 2024 gibt es zusätzlich ergänzende Empfehlungen zur Impfung gegen Rota-Viren (2 und 4 Monate) sowie gegen Meningokokken B (3, 6 und 15 Monate).

Ihre Kinderärzte stehen nach bestem Wissen für Ihre Fragen zur Verfügung, wir wollen Sie nicht bevormunden und sind überzeugt, dass wir Ihnen bei Ihrer Entscheidung durch umfassende Kenntnisse gute Hilfestellung geben können. Bitte sprechen Sie uns an, wenn sie Fragen haben.

Alter	Basisimpfungen (je Zeile eine Injektion)	Ergänzende Impfungen
<b>2 Monate</b>	DTPa IPV Hib HBV PCV	Rota (oral - keine Injektion, vor alter 16 Wochen)
<b>3 Monate</b>		MCV-B (auch mit 4 Monaten mögl., dann allerdings 3 Injektionen)
<b>4 Monate</b>	DTPa IPV Hib HBV PCV	Rota (oral - keine Injektion, vor Alter 24 Wochen)
<b>6 Monate</b>		MCV-B
<b>9 Monate</b>	MMRV	
<b>12 Monate</b>	DTPa IPV Hib HBV PCV	
<b>13 Monate</b>	MCV-ACWY MMRV	
<b>15 Monate</b>		MCV-B (auch mit 13 Monaten mögl.)
<b>4-7 Jahre</b>	DTPa IPV FSME (1. Dosis) FSME (2. Dosis, nach 1-2 Monaten) FSME (3. Dosis, nach 6-8 Monaten)	
<b>11-15 Jahre</b>	dTPa IPV HPV (1. Dosis) HPV (2. Dosis, nach 6 Monaten) MCV-ACWY HBV (falls noch nicht geimpft) HBV (2. Dosis nach 6 Monaten)	MCV-B
<b>Alle 10 Jahre</b>	FSME	
<b>Alle 20 Jahre</b>	dTPa	

DTPa: Impfung gegen Diphtherie-Tetanus-Pertussis

IPV: Inaktivierter Impfstoff gegen Poliomyelitis

Hib: Impfung gegen Haemophilus influenzae Typ b

HBV: Impfung gegen Hepatitis B Virus

PCV: 13-valenter konjugierter Impfstoff gegen Pneumokokken

Rota: Schluckimpfung gegen Rotaviren

MCV-B: konjugierter Impfstoff gegen Meningokokken Typ B

MMRV: quadrivalenter Impfstoff gegen Masern-Mumps-Röteln-Windpocken

MCV-ACWY: quadrivalenter konjugierter Impfstoff gegen Meningokokken

HPV: Impfung gegen humane Papillomaviren